



Productor cacaotero:

Recuerda que poniendo en práctica el Manejo Integrado de Plagas, reducirás los daños en tus mazorcas.

Evalúa las plagas presentes en tu campo de cacao.

- Realizar las podas necesarias en los árboles de cacao, evitando alturas mayores a 4 m.



- Regular la sombra, eliminando árboles frondosos que proporcionen excesiva sombra a la plantación.
- Abrir o limpiar drenajes, en plantaciones con suelos que presenten alta humedad, para evitar la formación de charcos de agua.
- No abandonar la plantación de cacao.

Con cosechas oportunas, vas a prevenir los daños ocasionados por hongos.

SENASA PERÚ

Dirección de Sanidad Vegetal

Subdirección de Moscas de la fruta y Proyectos Fitosanitarios

Sede Central: Av. La Molina 1915 - La Molina - Lima

Teléfono: 313-3300 Anexos 2800 y 2845

web: www.senasa.gob.pe

Senasa Perú /     

25 Años
SENASA
Servidores del campo



 *Trabajando para todos los peruanos*



**Moniliasis
del Cacao y su
Manejo Integrado**



En frutos mayores de tres meses, podemos ver una mancha color café claro, que en condiciones de alta humedad, se cubre de un polvo color crema, son las esporas del hongo, que contagiarán a las mazorcas sanas.



El viento, la lluvia y los insectos diseminan la enfermedad.



Moniliasis del Cacao

Una de las enfermedades más importantes en el cacao es la Moniliasis del Cacao causada por el hongo *Moniliophthora roreri*, está presente en todas las zonas cacaoteras del país, su incidencia varía según la zona de producción y la época del año.

Este hongo ataca los frutos y lo hace en cualquier estado de su desarrollo, siendo más susceptible cuando es más pequeño.

Esta enfermedad se ve favorecida por el exceso de sombra, los suelos pesados y mal drenados, alta humedad relativa y temperatura (T°18-28°C) y abundantes lluvias.

En frutos menores de tres meses, se observan deformaciones, estos “frutitos” se momifican y permanecen adheridos al árbol.



Otro síntoma que se observa es la madurez prematura de los frutos.



Medidas de Manejo Integrado

- Recoger y enterrar todas las mazorcas enfermas incluyendo los frutos momificados pegados al árbol y las que se encuentren en el suelo, con ello reduciremos el inóculo presente en el campo.
- Cosechar periódicamente los frutos maduros y sanos cada 15 días durante todo el año, usando tijeras para no dañar los cojines florales.
- Mantener la limpieza general de la plantación eliminando las malezas y chupones.